

CAI

HW 221

77T07

Government
Publications

SMOKING HABITS OF CANADIANS 1975


*non-medical use of drugs
& Libération*


*Depist
National*
Health and Welfare
Canada

Santé et Bien-être social
Canada

Technical Report Series

3 1761 11556748 9





CAI
NW 22
-77 TO

Technical Report Series

No. 7

December, 1977

SMOKING HABITS OF CANADIANS


1975

Research Bureau

Non-Medical Use of Drugs Directorate

Health Protection Branch

Department of National Health and Welfare



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115567489>

TABLE OF CONTENTS

	Page
LIST OF FIGURES	v
LIST OF TABLES	vi
I. INTRODUCTION	1
II. REGULAR CIGARETTE SMOKERS	2
i) Population 20 Years and Over	2
ii) Teenage Population	3
iii) Regional Distribution	3
iv) Educational Attainment and Smoking Behaviour	4
v) Occupation and Smoking Behaviour	5
vi) Rural-Urban Distribution	6
vii) Number of Cigarettes Smoked by Regular Smokers	6
III. OCCASIONAL CIGARETTE SMOKERS	8
IV. SUCCESSFUL QUITTERS	9
i) Principal Aid Used	9
ii) Reason for Quitting	9
V. SUMMARY	10
TABLES	11
APPENDIX	27

LIST OF FIGURES

	Page
Figure a. - Percentage of regular cigarette smokers in the population 15 to 19 years of age, and 20 years of age and over, males and females, Canada, 1965, 1970, 1974, 1975	2
Figure b. - Percentage of regular cigarette smokers in the population 15 years of age and over by highest level of education completed, males and females, Canada, 1975	5
Figure c. - Percentage of regular cigarette smokers in the population 15 years of age and over by occupational group, males and females, Canada, 1975	6

LIST OF TABLES

	Page
Table 1a - Percentage of regular cigarette smokers in the male population 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by age group, 1970, 1974, 1975	13
1b - Percentage of regular cigarette smokers in the female population 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by age group, 1970, 1974, 1975	14
1c - Percentage of regular cigarette smokers in the population of Canada, both sexes, 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by age group, 1970, 1974, 1975	15
Table 2a - Percentage of regular cigarette smokers in the male population 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by region, Canada, 1970, 1974, 1975	16
2b - Percentage of regular cigarette smokers in the female population 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by region, Canada, 1970, 1974, 1975	17
Table 3a - Percentage of regular cigarette smokers in the male population 15 years of age and over, by region, by age group, 1972, 1974, 1975	18
3b - Percentage of regular cigarette smokers in the female population 15 years of age and over, by region, by age group, 1972, 1974, 1975	19
Table 4 - Percentage of regular cigarette smokers in the male and female population 15 years of age and over, by level of education, by age group, Canada, 1975	20
Table 5 - Percentage of regular cigarette smokers in the male and female population 15 years of age and over, by level of education, by region, 1975	21
Table 6 - Percentage of regular cigarette smokers in the male and female population 15 years of age and over, according to the number of cigarettes smoked per day, by level of education, Canada, 1975	22
Table 7 - Percentage and rank order of regular cigarette smokers in the male and female population 15 years of age and over, by occupation, Canada, 1975	23
Table 8 - Percentage of regular cigarette smokers in the male and female population 15 years of age and over, by rural-urban distribution, Canada, 1975	24
Table 9 - Percentage of occasional smokers in the male and female population 15 years of age and over, by age group, Canada, 1970, 1974, 1975	25

I. INTRODUCTION

The following report is based on data obtained from the Canadian Smoking Habits Surveys. These data are collected for the Department of National Health and Welfare by Statistics Canada in conjunction with the annual Labour Force Survey. Questions relating to smoking behaviour have been included in the Labour Force Survey since 1965 (Appendix). Seventy-five thousand Canadians in approximately 30,000 households across the country are questioned. Inmates of institutions, members of the armed services, Indians living on reserves, and residents of the Yukon and Northwest Territories are not included in the sample population.

The present report focusses primarily on the smoking habits of Canadians during the years 1974 and 1975. It examines smoking behaviour changes in the regular and occasional smoking population. Data for these smoker groups are analyzed according to sex, age (five-year age categories, fifteen years of age and over) and regional distribution (Atlantic Region, Quebec, Ontario, Prairie Region, British Columbia and Canada). A breakdown of the regular smoking population by the number of cigarettes smoked per day (1 to 10, 11 to 25, and over 25) is also given. Information with respect to educational attainment, occupational classification, and urban distribution is presented for the 1975 data.

A new addition to the 1975 Canadian Smoking Habits Survey is the examination of those persons who have successfully quit smoking. This report provides information with respect to reasons given for quitting, as well as principal aid used in quitting, by sex.



II. REGULAR CIGARETTE SMOKERS

Regular cigarette smokers are defined as those who smoke cigarettes usually every day.

i) Population 20 Years and Over


According to the 1975 data, regular smoking among the Canadian adult population is continuing to decline (Figure a). In 1975, 38.7 percent of the population 20 years of age and over indicated that they smoke cigarettes regularly. This represents a slight decline from the 1974 figure and an overall decrease of 3.5 percent since 1970 (Table 1c).

Substantial decreases in regular smoking by adult males during the past ten years have been largely responsible for the apparent decline in regular smoking on the part of Canadians. This continues to be the case, as indicated by Table 1a. Between 1974 and 1975, there was a 1.9 percent decrease in regular smoking by adult males, the largest percentage decreases occurring in the age groups 20 to 24 and 25 to 44. These age groups, on the other hand, continued to have the highest percentage of smokers. Approximately forty-eight percent of males in each of these groups indicated they smoked regularly.

In the adult female population, a consistently lower percentage of females than males smoke cigarettes regularly at all age levels. Between 1974 and 1975, the percentage of female smokers remained unchanged at 32.0 percent (Table 1b). During the past eleven years, the percentage of regular female smokers 20 years of age and over has remained relatively stable (Figure a).

FIGURE a

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE POPULATION
15 TO 19 YEARS OF AGE, AND 20 YEARS OF AGE AND OVER, MALES
AND FEMALES, CANADA, 1965, 1970, 1974, 1975



The highest percentages of female smokers in 1975 were found in the age groups 20 to 24 (38.3 percent) and 25 to 44 (37.0 percent), respectively. Nevertheless, decreases in the percentage of smokers in these younger age groups have been apparent since 1970. Table 1b, on the other hand, shows a notable increase in the percentage of older female smokers during 1975.

ii) Teenage Population

The percentage of regular smokers in the teenage population declined 1.6 percent between 1974 and 1975 to 28.5 percent (Table 1c). This decrease is consistent with data for the years 1972 and 1973 which indicated a leveling-off and perhaps decline in the regular use of tobacco by the teenage population.

Decreases have been noted in male teenage smoking since 1970. In 1970, 35.7 percent of teenage males were regular smokers, compared to 32.3 percent in 1974 and 29.5 percent in 1975 (Table 1a).

During the past three years, the percentage of regularly smoking teenage girls has remained at approximately 27 to 28 percent of the female population 15 to 19 years of age (Figure a).

iii) Regional Distribution

Considerable differences still exist in the regional distribution of regular cigarette smokers in Canada. As in the past, Quebec continued to have the highest percentage of male cigarette smokers 15 years of age and over during 1975 (Technical Report No. 1, Smoking Habits of Canadians 1965-1974). Approximately fifty percent of the Quebec male population indicated that they smoked, followed in order by the Atlantic Region (44.5 percent), Ontario (40.6 percent), the Prairie Region (39.5 percent) and British Columbia (39.2 percent) (Table 2a).

From 1966 to 1974 (Technical Report No. 1, Smoking Habits of Canadians 1965-1974) all regions experienced a decline in regular smoking by males. The 1975 data show a continuation of this decline for all regions, excluding British Columbia. A 1.5 percent increase in male smoking was noted in this region during the past year (Table 2a). The largest percentage decreases for the 1974-1975 period occurred in Quebec (4.5 percent) and the Atlantic Region (2.3 percent). These regions have displayed the largest percentage decreases since 1970 (Table 2a). In Quebec, the greatest proportion of the overall decrease in the past year was shown by those in the 25 to 44-year age group where a 10.4 percent decline was apparent (Table 3a). In the Atlantic Region, smoking among teenage boys showed the greatest drop during this time period (6.2 percent). Also notable was a 10.2 percent decline in the percentage of male smokers aged 20 to 24 in Ontario (Table 3a).

A regional breakdown of the data for females shows that Quebec had the highest percentage of female smokers (34.6 percent) in 1975. In the Atlantic Region and British Columbia, 30.3 percent of the females in each region indicated that they smoked cigarettes regularly, compared with 30.1 percent in Ontario, and 29.9 percent in the Prairie Region (Table 2b).

From 1974 to 1975, greatest decreases were apparent in female smoking in Quebec, particularly in the 20 to 24 year age group, and in the Prairie Region (Tables 2b, 3b). Data for Ontario, on the other hand, showed increases in the use of cigarettes by women, largely among those 45 to 64, 65 and over, and 25 to 44 years of age, respectively (Table 3b). Although overall figures for female smoking in British Columbia were relatively stable between 1974 and 1975, the percentage of women smoking regularly in the 20 to 24-year age group increased 9.1 percent (Table 3b).

Among the teenage population, Ontario had the lowest percentage of male regular smokers (22.2 percent) and Quebec, the highest percentage (40.7 percent), in 1975. All regions (excluding British Columbia) experienced some decline in smoking by teenage boys during this period, with the Atlantic Region and Ontario showing the largest decreases (6.2 percent and 4.3 percent, respectively) (Table 3a).

Smoking among teenage girls appears to have remained relatively stable in most regions since 1972, with the exception of Quebec and Ontario (Table 3b). A notable 2.6 percent decline was apparent in Quebec between 1974 and 1975, while Ontario experienced a 1.5 percent increase during the same period.

iv) Educational Attainment and Smoking Behaviour

The following categories were used in the survey to define "educational attainment":

'Grade 8 or less' - refers to those persons who have a level of formal education from 0 to grade 8.

'High School' - refers to those persons who have begun and/or completed the requirements for high school graduation.

'Post Secondary' - refers to those persons who have completed high school and have begun or completed the requirements for a degree or diploma at the university or college level.

'Other' - refers to those persons with educational training other than that listed above (Data with respect to 'other' education has not been included in this report).

In the male population 15 years of age and over, the percentage of regular cigarette smokers appeared to decrease as level of education increased (Figure b, Table 4). In 1975, 48.5 percent of males with grade 8 or less indicated that they smoked regularly, while only 45.4 percent of males at the high school level and 30.7 percent at the post secondary level indicated that they were regular users of cigarettes.

The largest percentage of male smokers at the 'grade 8 or less', 'high school' and 'post secondary' educational levels were found in the age groups 25 to 44 years (59.1 percent), 20 to 24 years (56.3 percent) and 20 to 24 years (32.2 percent), respectively. The lowest percentages were found consistently in the youngest and oldest age groups in each educational category. Particularly notable were the relatively low percentages in all age groups of male smokers with post secondary education. In addition, there appeared to be less variation between age groups in the percentage of smokers with post secondary education compared to those in the other two categories.

In the female population 15 years of age and over, women with post secondary education were the least likely to be regular smokers; only 25.9 percent indicated they used cigarettes regularly (Figure b, Table 4). In contrast to the male population, however, the highest percentage of female smokers was found among those with high school education (34.5 percent). This pattern appeared to be true for women of all ages, excluding teenagers and those 65 years and over.

The largest percentages of female smokers at the 'grade 8 or less', 'high school' and 'post secondary' educational levels were found in the age groups 15 to 19 years (40.3 percent), 20 to 24 years (43.9 percent) and 25 to 44 years (27.8 percent), respectively.

Among teenage boys and girls, there was a notable decrease in the percentage of regular cigarette smokers as educational level increased. As seen in Table 4, there were large differences in teenage smoking between educational groups; the relatively high percentage of teenage smokers with grade 8 or less (40.2 percent) was particularly notable. There was little variation in smoking habits between teenage males and females within each educational category.

Certainly, the relationship between educational attainment and the use of cigarettes is complex, involving such variables as age, sex, occupation, income and general lifestyle. The systematic study of the effects of education vis-à-vis other variables is necessary before further interpretation of the present data (Table 4) is possible.

Regional comparisons indicate that in all regions, with the exception of the Prairies and perhaps British Columbia, the percentage of male smokers decreases as educational level increases (Figure b). As seen in Table 5, variation between regions in 1975 was greatest among males with the least amount of education. Quebec experienced the highest percentage of male smokers within each educational category.


Similarly, among the female population, Quebec had the highest percentage of regular smokers in all educational groups (Table 5). Regional variation was greatest among females with grade 8 or less education.

Among females, there appeared to be an "east-west" regional variation in the percentage of smokers with respect to educational level. That is, in Quebec and the Atlantic Region females with high school education had the highest percentage of regular smokers; those with post secondary education had the lowest. On the other hand, in Ontario, the Prairie Region and British Columbia, females with high school education had the highest percentage of smokers, while those with grade 8 or less had the lowest percentage.

Analyses of regional data by age resulted in percentages based on numbers too small to be statistically reliable.

FIGURE b

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER BY HIGHEST LEVEL OF EDUCATION
COMPLETED, MALES AND FEMALES, CANADA, 1975



A Grade 8 or less

B High school attendance or graduation

C Post-secondary school attendance or graduation

v) Occupation and Smoking Behaviour


As seen in Figure c, smoking behaviour varies from one occupational group to another. A rank ordering of the percentages of regular users in each occupational category indicated that both males and females in the categories "transport" and "mining" were most likely to smoke regularly. Those in the "professional", "not working" and "outdoors" categories were least likely to be smokers (Table 7).

Differences in rank order between males and females were most apparent in the "managerial" and "product fabricating" groups. Also notable were the small percentage differences between males and females in the "managerial", "professional" and "not working" categories.

The smoking behaviour of different occupational groups is possibly related to pressures associated with particular occupations, as well as to age, sex and educational factors. On the basis of the present data, one can only speculate as to the nature of the relationship between occupation and smoking. For example, it seems probable that persons in the "professional" category would be more likely to have post secondary education than those in "transport" and "mining"; as indicated by 1975 data, persons with higher levels of education seemed less likely to smoke cigarettes.

FIGURE c

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE POPULATION 15 YEARS OF AGE AND OVER BY OCCUPATIONAL GROUP, MALES AND FEMALES, CANADA, 1975



vi) Rural-Urban Distribution

As seen in Table 8, persons living in rural and large urban areas (population 100,000) were less likely to be regular cigarette users than persons residing in small towns and cities.

vii) Number of Cigarettes Smoked by Regular Smokers

Tables 1a and 1b show that the majority of regular smokers smoke approximately 11 to 25 cigarettes per day. This appears to be true for both males and females of all ages.

Between 1974 and 1975 decreases occurred in the percentage of male smokers 15 years of age and over smoking 1 to 10, 11 to 25 and over 25 cigarettes per day (Table 1a). Decreases were particularly noticeable in the age groups 15 to 19, 20 to 24 and 25 to 44 years. For example, the percentage of males 20 to 24 years of age smoking 11 to 25 cigarettes per day dropped 2.6 percent between 1974 and 1975. Similarly, in the 25 to 44-year age group, the percentage of males smoking 11 to 25, and over 25 cigarettes per day declined 1.5 percent and 1.2 percent, respectively. A slight increase in the percentage of males in this age group smoking 1 to 10 cigarettes per day may indicate that male smokers 25 to 44 years of age are attempting to "cut down" the number of cigarettes they smoke daily.

According to data in Table 1b, regular female smokers aged 20 to 24 and 45 to 64 years appeared to be smoking more frequently on a daily basis between 1974 and 1975. Decreases in the percentage of smokers aged 20 to 24 years smoking 1 to 10 and 11 to 25 cigarettes per day occurred, with an accompanying increase in the percentage smoking over 25 cigarettes per day. In the 45 to 64-year age group, increases occurred in the percentage of females smoking 1 to 10 and 11 to 25 cigarettes daily.

Table 6 presents the number of cigarettes smoked per day by level of education for males and females 15 years of age and over in 1975. It is interesting to note that males and, to a lesser extent, females, with post secondary education, smoked fewer cigarettes daily than smokers at other educational levels. Male smokers with grade 8 or less education had the highest daily consumption.

III. OCCASIONAL CIGARETTE SMOKERS

An occasional cigarette smoker is defined as an individual who does not usually smoke every day.

The percentage of occasional cigarette smokers 15 years of age and over has increased slightly since 1970, from 3.0 percent to 4.2 percent in 1975 (Table 9). This may reflect the "cutting down" on cigarette consumption by regular smokers; on the other hand, it may simply indicate that more Canadians are beginning to smoke.

As in previous years, the percentage of occasional smokers was greatest, for both males and females, in the experimenting age groups 15 to 19 and 20 to 24.

IV. SUCCESSFUL QUITTERS

Questions pertaining to persons who had successfully stopped smoking cigarettes were included in the 1975 Canadian Smoking Habits Survey (Appendix). These questions provided information concerning: 1) principal aids used to quit smoking, and 2) main reasons for quitting. Data was analyzed according to regional distribution, educational attainment, age and sex.

According to 1975 survey data, 11.7 percent of the Canadian population 15 years of age and over indicated that they had successfully stopped smoking. Approximately 16 percent of the male population and 7.5 percent of the female population were ex-regular smokers.

i) Principal Aid Used

Results of the data indicated that regardless of region, age, educational level and sex, the majority of successful quitters (75.4 percent of male quitters and 77.1 percent of female quitters) used "no aid" to assist them in stopping smoking. These figures, however, may simply reflect an unwillingness on the part of quitters to admit to the need of assistance.

The percentage of quitters relying on assistance from "relatives or friends" appeared to diminish with increased age. While 13 percent of males and 8 percent of females in the 15 to 19 year-old age group admitted to such influence, only 3 percent of both males and females 65 years of age and over responded to this category. As might be anticipated, responses to medical doctors' influence in quitting smoking appeared to increase in the older age groups.

Reliance upon substitutes and medical doctors' aid appeared to vary slightly according to educational level. Quitters with post secondary education seemed to rely more heavily on substitutes than those with grade 8 education or less (grade 8 or less, 4 percent, males, 2 percent females; post secondary, 7 percent males, 4 percent females). On the other hand, quitters with grade 8 level of education or less appeared to be more influenced by medical doctors than those with higher levels of education (grade 8 or less, 14 percent males, 11 percent females; post secondary, 5 percent and 4 percent, respectively).

Use of "smokers' clinics" and "T.V., radio, pamphlets and booklets" constituted a very small percentage of responses. Availability of these resources, in addition to other factors, undoubtedly influenced the present results.

ii) Reason for Quitting

The majority of successful quitters (62.2 percent males, 56.3 percent females) indicated that they gave up cigarette smoking because of health reasons. Not surprisingly, the percentage of quitters in this category tended to increase with increased age. This trend appeared more pronounced among males. Other response categories constituted only a small percentage of the total responses. "Economic pressures" seemed to be more pertinent to younger age groups (15 to 19 and 20 to 24 years); "concern for others" was mentioned more frequently by females than males.

There was little variation due to regional distribution and educational level.

V. SUMMARY

- 1) The percentage of regular smokers in the Canadian population continues to decline. In 1975, 38.7 percent of the Canadian population 20 years of age and over were regular cigarette smokers, compared to 39.6 percent in 1974 and 42.2 percent in 1970.
- 2) Substantial decreases in regular smoking by adult males during the past ten years have been largely responsible for the decline in the percentage of Canadian smokers. Between 1974 and 1975 there was a further 1.9 percent decrease.
- 3) Regular smoking among the adult female population has remained relatively stable during the past decade. In 1975, the percentage of female smokers remained unchanged at 32.0 percent.
- 4) The percentage of regular smokers in the teenage population dropped 1.6 percent between 1974 and 1975 to 28.5 percent. This change was largely attributable to a decline in the percentage of smoking teenage boys. During the past three years, smoking among teenage girls has stabilized at approximately 27 to 28 percent of the female population 15 to 19 years of age.
- 5) In 1975, Quebec continued to have the highest percentage of male smokers 15 years of age and over (50.4 percent), followed by the Atlantic Region (44.5 percent), Ontario (40.6 percent), the Prairie Region (39.5 percent) and British Columbia (39.2 percent). Most regions experienced declines in the percentage of regular male smokers between 1974 and 1975, with Quebec showing the largest decrease (4.5 percent).
- 6) During 1975 the highest percentage of regular smokers in the female population 15 years of age and over was again found in Quebec (34.6 percent); the lowest percentage occurred in the Prairie Region (29.9 percent).
- 7) An examination of the relationship between education level and use of cigarettes indicated that the lowest percentage of regular male smokers occurred among persons with post secondary education. The highest percentage was found among those with grade 8 education or less.
- 8) The highest percentage of regular smokers among Canadian females 15 years of age and over was found among those with at least some secondary school education (34.5 percent). The percentage of regular female smokers among persons at the post secondary or grade 8 or less educational levels were substantially lower (25.9 percent and 27.1 percent, respectively).
- 9) Males and females in the occupational categories "transport" and "mining" were more likely to be regular cigarette smokers than persons in other occupational groups.
- 10) Persons living in rural areas and large urban centres (100,000 population) seemed less likely to be regular smokers than persons residing in small towns and cities.
- 11) Male regular smokers appeared to be smoking fewer cigarettes between 1974 and 1975, particularly those in the age groups 20 to 24 and 25 to 44 years. There were increases in the percentage of female smokers aged 20 to 24 smoking over 25 cigarettes daily.
- 12) Between 1974 and 1975, the percentage of occasional smokers in the Canadian population increased slightly in all age groups.
- 13) According to the 1975 data, the majority of successful quitters used "no aid" to assist them in stopping smoking.
- 14) More than 50 percent of successful quitters stopped using cigarettes because of health reasons.

TABLES / TABLEAUX

TABLE/TABLEAU 1a

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY,
BY AGE GROUP, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS DANS LA POPULATION MASCULINE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR ET LE
GROUPE D'ÂGE, 1970, 1974, 1975

Age Group/ Groupe d'âge	Number of Cigarettes Smoked Per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour				Differences/Différences	
		1970	1974	1975	1970-1974	1974-1975
TOTAL 15 YEARS AND OVER/ TOTAL 15 ANS ET PLUS	1-10	9.9	7.9	7.3	-2.0	-0.6
	11-25	33.0	32.1	31.3	-0.9	-0.8
	over 25/plus de 25	6.0	5.2	4.7	-0.8	-0.5
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	48.9	45.3	43.3	-3.6	-2.0
15-19	1-10	16.3	12.2	10.0	-4.1	-2.2
	11-25	18.6	19.3	18.6	0.7	-0.7
	over 25/plus de 25	*	*	*		
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	35.7	32.3	29.5	-3.4	-2.8
20-24	1-10	11.2	9.1	8.3	-2.1	-0.8
	11-25	38.6	39.4	36.8	0.8	-2.6
	over 25/plus de 25	4.1	3.3	3.2	-0.8	-0.1
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	53.9	51.9	48.3	-2.0	-3.6
25-44	1-10	7.4	6.0	6.2	-1.4	0.2
	11-25	40.2	37.8	36.3	-2.4	-1.5
	over 25/plus de 25	8.0	7.1	5.9	-0.9	-1.2
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	55.5	51.0	48.3	-4.5	-2.7
45-64	1-10	9.1	7.1	6.4	-2.0	-0.7
	11-25	34.2	33.1	33.2	-1.1	0.1
	over 25/plus de 25	8.1	7.0	6.9	-1.1	-0.1
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	51.3	47.1	46.5	-4.2	-0.6
65 YEARS AND OVER/ 65 ANS ET PLUS	1-10	10.5	8.9	8.2	-1.6	-0.7
	11-25	17.8	17.5	19.0	-0.3	1.5
	over 25/plus de 25	3.0	2.6Q	2.1Q	-0.4Q	-0.5Q
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	31.4	29.0	29.3	-2.4	0.3
TOTAL 20 YEARS AND OVER/ TOTAL 20 ANS ET PLUS	1-10	8.8	7.2	6.8	-1.6	-0.4
	11-25	35.5	34.3	33.5	-1.2	-0.8
	over 25/plus de 25	6.8	6.0	5.3	-0.8	-0.7
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	51.1	47.5	45.6	-3.6	-1.9

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Surveys by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 1b

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY,
BY AGE GROUP, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEUSES HABITUELLES DANS LA POPULATION FÉMININE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR ET LE
GROUPE D'ÂGE, 1970, 1974, 1975

Age Group/ Groupe d'âge	Number of Cigarettes Smoked Per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour	1970	1974	1975	Differences/Différences	
					1970-1974	1974-1975
TOTAL						
15 YEARS	1-10	10.1	8.4	8.8	-1.7	0.4
AND OVER/	11-25	20.5	21.0	20.6	0.5	-0.4
TOTAL	over 25/plus de 25	1.8	2.0	2.0	0.2	0.0
15 ANS	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	32.4	31.5	31.4	-0.9	-0.1
ET PLUS						
15-19	1-10	13.2	12.6	12.4	-0.6	-0.2
	11-25	11.3	14.4	14.3	3.1	-0.1
	over 25/plus de 25	*	*	*		
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	24.9	27.8	27.4	2.9	-0.4
20-24	1-10	12.0	10.2	9.9	-1.8	-0.3
	11-25	27.5	28.6	26.0	1.1	-2.6
	over 25/plus de 25	2.0	1.6Q	2.4Q	-0.4Q	0.8Q
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	41.4	40.4	38.3	-1.0	-2.1
25-44	1-10	10.5	8.0	8.9	-2.5	0.9
	11-25	26.8	26.3	25.3	-0.5	-1.0
	over 25/plus de 25	2.7	3.0	2.7	0.3	-0.3
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	40.0	37.4	37.0	-2.6	-0.4
45-64	1-10	9.4	7.9	8.2	-1.5	0.3
	11-25	20.2	20.4	21.6	0.2	1.2
	over 25/plus de 25	1.9	2.2	2.1	0.3	-0.1
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	31.5	30.4	31.8	-1.1	1.4
65 YEARS AND OVER/ 65 ANS ET PLUS	1-10	4.9	4.2	4.3	-0.7	0.1
	11-25	5.4	6.0	5.9	0.6	-0.1
	over 25/plus de 25	*	*	*		
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	10.5	10.6	10.8	0.1	0.2
TOTAL 20 YEARS AND OVER/ TOTAL 20 ANS ET PLUS	1-10	9.6	7.7	8.2	-1.9	0.5
	11-25	22.0	22.0	21.6	0.0	-0.4
	over 25/plus de 25	2.0	2.2	2.2	0.2	0.0
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	33.6	32.0	32.0	-1.6	0.0

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Surveys by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 1c

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE POPULATION OF CANADA,
BOTH SEXES, 15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES
SMOKED PER DAY, BY AGE GROUP, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR
ET LE GROUPE D'ÂGE, 1970, 1974, 1975

Age Group/ Groupe d'âge	Number of Cigarettes Smoked per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour	1970	1974	1975	Differences/Différences	
					1970-1974	1974-1975
TOTAL	1-10	10.0	8.2	8.0	-1.8	-0.2
15 YEARS	11-25	26.7	26.5	25.9	-0.2	-0.6
AND OVER/	over 25/plus de 25	3.9	3.6	3.3	-0.3	-0.3
TOTAL	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	40.6	38.3	37.3	-2.3	-1.0
15-19	1-10	14.7	12.4	11.2	-2.3	-1.2
	11-25	15.0	17.0	16.5	2.0	-0.5
	over 25/plus de 25	0.7	0.7Q	0.8Q	0.0Q	0.1Q
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	30.5	30.1	28.5	-0.4	-1.6
20-24	1-10	11.6	9.6	9.1	-2.0	-0.5
	11-25	33.1	34.1	31.5	1.0	-2.6
	over 25/plus de 25	3.0	2.5	2.8	-0.5	0.3
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	47.7	46.3	43.4	-1.4	-2.9
25-44	1-20	8.9	7.0	7.6	-1.9	0.6
	11-25	33.5	32.1	30.8	-1.4	-1.3
	over 25/plus de 25	5.3	5.1	4.3	-0.2	-0.8
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	47.7	44.2	42.6	-3.5	-1.6
45-64	1-10	9.2	7.5	7.3	-1.7	-0.2
	11-25	27.1	26.6	27.3	-0.5	0.7
	over 25/plus de 25	4.9	4.6	4.4	-0.3	-0.2
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	41.2	38.6	39.0	-2.6	0.4
65 YEARS	1-10	7.4	6.2	6.0	-1.2	-0.2
AND OVER/	11-25	11.1	11.1	11.6	0.0	0.5
65 ANS	over 25/plus de 25	1.5	1.4Q	1.3Q	-0.1Q	-0.1Q
ET PLUS	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	20.1	18.7	19.0	-1.4	0.3
TOTAL	1-10	9.2	7.5	7.5	-1.7	0.0
20 YEARS	11-25	28.6	28.1	27.4	-0.5	-0.7
AND OVER/	over 25/plus de 25	4.4	4.1	3.7	-0.3	-0.4
TOTAL	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	42.2	39.6	38.7	-2.6	-0.9

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 2a

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY,
BY REGION, CANADA, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS DANS LA POPULATION MASCULINE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR ET LA RÉGION,
CANADA, 1970, 1974, 1975

REGION/ RÉGION	Number of Cigarettes Smoked per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour	1970	1974	1975	Differences/Différences	
					1970-1974	1974-1975
CANADA	1-10	9.9	7.9	7.3	-2.0	-0.6
	11-25	33.0	32.1	31.3	-0.9	-0.8
	over 25/plus de 25	6.0	5.2	4.7	-0.8	-0.5
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	48.9	45.3	43.3	-3.6	-2.0
ATLANTIC REGION/ RÉGION DE L'ATLANTIQUE	1-10	11.0	8.8	7.0	-2.2	-1.8
	11-25	34.0	33.1	32.7	-0.9	-0.4
	over 25/plus de 25	5.7	4.9	4.8	-0.8	-0.1
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	50.7	46.8	44.5	-3.9	-2.3
QUEBEC/ QUÉBEC	1-10	11.7	9.4	8.2	-2.3	-1.2
	11-25	39.2	38.2	36.2	-1.0	-2.0
	over 25/plus de 25	8.1	7.3	6.0	-0.8	-1.3
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	59.0	54.9	50.4	-4.1	-4.5
ONTARIO	1-10	8.8	7.3	7.1	-1.5	-0.2
	11-25	30.2	29.8	29.2	-0.4	-0.6
	over 25/plus de 25	5.3	4.8	4.3	-0.5	-0.5
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	44.3	41.9	40.6	-2.4	-1.3
PRAIRIE REGION/ RÉGION DES PRAIRIES	1-10	9.6	7.3	6.7	-2.3	-0.6
	11-25	30.7	30.1	30.0	-0.6	-0.1
	over 25/plus de 25	3.5	3.4	2.8	-0.1	-0.6
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	43.9	40.8	39.5	-3.1	-1.3
BRITISH COLUMBIA/ COLOMBIE- BRITANNIQUE	1-10	8.6	6.4	6.6	-2.2	0.2
	11-25	28.8	26.7	27.0	-2.1	0.3
	over 25/plus de 25	6.5	4.7	5.6	-1.8	0.9
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	44.0	37.7	39.2	-6.3	1.5

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 2b

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY,
BY REGION, CANADA, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEUSES HABITUELLES DANS LA POPULATION FÉMININE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR ET LA RÉGION,
CANADA, 1970, 1974, 1975

REGION/ RÉGION	Number of Cigarettes Smoked per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour	1970	1974	1975	Differences/Différences	
					1970-1974	1974-1975
CANADA	1-10	10.1	8.4	8.8	-1.7	0.4
	11-25	20.5	21.0	20.6	0.5	-0.4
	over 25/plus de 25	1.8	2.0	2.0	0.2	0.0
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	32.4	31.5	31.4	-0.9	-0.1
ATLANTIC REGION/ RÉGION DE L'ATLANTIQUE	1-10	10.5	9.2	8.3	-1.3	-0.9
	11-25	18.7	20.1	20.2	1.4	0.1
	over 25/plus de 25	*	1.6	1.7		0.1
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	30.5	39.0	30.3	0.4	-0.6
QUEBEC/ QUÉBEC	1-10	12.1	9.9	10.3	-2.2	0.4
	11-25	21.6	23.8	21.9	2.2	-1.9
	over 25/plus de 25	2.0	2.4	2.4	0.4	0.0
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	35.8	36.1	34.6	0.3	-1.5
ONTARIO	1-10	9.1	7.4	8.6	-1.7	1.2
	11-25	19.9	19.1	19.8	-0.8	0.7
	over 25/plus de 25	1.7	2.0	1.7	0.3	-0.3
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	30.7	28.4	30.1	-2.3	1.7
PRAIRIE REGION/ RÉGION DES PRAIRIES	1-10	9.4	8.2	7.3	-1.2	-0.9
	11-25	20.6	21.6	21.4	1.0	-0.2
	over 25/plus de 25	1.2	1.3Q	1.2Q	0.1Q	-0.1Q
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	31.2	31.2	29.9	0.0	-1.3
BRITISH COLUMBIA/ COLOMBIE- BRITANNIQUE	1-10	8.8	7.7	7.7	-1.1	0.0
	11-25	21.0	20.5	19.4	-0.5	-1.1
	over 25/plus de 25	3.0	2.6Q	3.2	-0.4Q	0.6
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	32.8	30.6	30.3	-2.2	-0.3

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 3a

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY REGION, BY AGE GROUP, 1972, 1974, 1975
POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS DANS LA POPULATION MASCULINE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LA RÉGION ET LE GROUPE D'ÂGE, 1972, 1974, 1975

Age Group/ Groupe d'âge	Year/ Année	Canada	Atlantic Region/ Région de l'Atlantique	Quebec/ Québec	Ontario	Prairie Region/ Région des Prairies	British Columbia/ Colombie-Britannique
TOTAL 15 YEARS AND OVER/ TOTAL 15 ANS ET PLUS	1972	47.4	48.0	57.1	43.8	42.0	41.8
	1974	45.3	46.8	54.9	41.9	40.8	37.7
	1975	43.3	44.5	50.4	40.6	39.5	39.2
	(Diff.) '72-74	-2.1	-1.2	-2.2	-1.9	-1.2	-4.1
	(Dif.) '74-75	-2.0	-2.3	-4.5	-1.3	-1.3	1.5
15-19	1972	35.0	37.5	44.0	30.4	31.2	27.4
	1974	32.3	37.4	42.4	26.5	27.1	27.0
	1975	29.5	31.2	40.7	22.2	25.4	27.2
	(Diff.) '72-74	-2.7	-0.1	-1.6	-3.9	-4.1	-0.4
	(Dif.) '74-75	-2.8	-6.2	-1.7	-4.3	-1.7	0.2
20-24	1972	52.6	53.9	61.3	47.8	47.5	49.5
	1974	51.9	51.2	58.7	51.0	47.7	42.9
	1975	48.3	52.5	59.2	40.8	44.4	43.4
	(Diff.) '72-74	-0.7	-2.7	-2.6	3.2	0.2	-6.6
	(Dif.) '74-75	-3.6	1.3	0.5	-10.2	-3.3	0.5
25-44	1972	53.3	54.1	62.2	50.4	47.0	47.9
	1974	51.0	53.6	60.6	47.7	47.5	41.8
	1975	48.3	49.4	50.2	49.7	45.7	41.9
	(Diff.) '72-74	-2.3	-0.5	-1.6	-2.7	0.5	-6.1
	(Dif.) '74-75	-2.7	-4.2	-10.4	2.0	-1.8	0.1
45-64	1972	50.0	52.2	61.4	45.4	44.9	43.3
	1974	47.1	48.9	57.9	43.6	41.7	39.2
	1975	46.5	47.2	55.8	42.6	43.0	41.8
	(Diff.) '72-74	-2.9	-3.3	-3.5	-1.8	-3.2	-4.1
	(Dif.) '74-75	-0.6	-1.7	-2.1	-1.0	1.3	2.6
65 YEARS AND OVER/ 65 ANS ET PLUS	1972	30.4	28.4	39.2	28.2	28.7	23.3Q
	1974	29.0	29.9	37.0	24.3	29.5	25.6Q
	1975	29.3	31.6	37.4	23.9	26.0	32.4
	(Diff.) '72-74	-1.4	1.5	-2.2	-3.9	0.8	2.3
	(Dif.) '74-75	0.3	1.7	0.4	-0.4	-3.5	6.8Q
TOTAL 20 YEARS AND OVER/ TOTAL 20 ANS ET PLUS	1972	49.5	50.2	59.5	46.0	43.8	43.8
	1974	47.5	48.8	57.1	44.4	43.2	39.3
	1975	45.6	47.2	52.1	43.5	42.0	41.0
	(Diff.) '72-74	-2.0	-1.4	-2.4	-1.6	-0.6	-4.5
	(Dif.) '74-75	-1.9	-1.6	-5.0	-0.9	-1.2	1.7

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 3b

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY REGION, BY AGE GROUP, 1972, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEUSES HABITUELLES DANS LA POPULATION FÉMININE
DE 15 ANS ET PLUS SELON LA RÉGION ET LE GROUPE D'ÂGE, 1972, 1974, 1975

Age Group/ Groupe d'âge	Year/ Année	Canada	Atlantic Region/ Région de l'Atlantique	Quebec/ Québec	Ontario	Prairie Region/ Région des Prairies	British Columbia/ Colombie-Britannique
TOTAL 15 YEARS AND OVER/ TOTAL 15 ANS ET PLUS	1972	32.4	29.8	37.2	29.6	31.0	33.3
	1974	31.5	30.9	36.1	28.4	31.2	30.6
	1975	31.4	30.3	34.6	30.1	29.9	30.3
	(Diff.) '72-74	-0.9	1.1	-1.1	-1.2	0.2	-2.7
	(Dif.) '74-75	-0.1	-0.6	-1.5	1.7	-1.3	-0.3
15-19	1972	28.4	25.2	38.6	23.1	25.9	24.8Q
	1974	27.8	25.4	35.9	22.7	26.1	27.3
	1975	27.4	24.4	33.3	24.2	26.3	26.4
	(Diff.) '72-74	-0.6	0.2	-2.7	-0.4	0.2	2.5Q
	(Dif.) '74-75	-0.4	-1.0	-2.6	1.5	0.2	-0.9
20-24	1972	40.6	38.6	46.3	37.3	39.6	38.3
	1974	40.4	40.7	49.0	35.1	40.0	34.0
	1975	38.3	40.5	40.9	33.1	39.7	43.1
	(Diff.) '72-74	-0.2	2.1	2.7	-2.2	0.4	-4.3
	(Dif.) '74-75	-2.1	-0.2	-8.1	-2.0	-0.3	9.1
25-44	1972	38.8	37.7	43.3	34.7	39.6	40.7
	1974	37.4	39.8	40.9	34.3	37.9	36.4
	1975	37.0	38.8	39.3	36.1	36.6	33.1
	(Diff.) '72-74	-1.4	2.1	-2.4	-0.4	-1.7	-4.3
	(Dif.) '74-75	-0.4	-1.0	-1.6	1.8	-1.3	-3.3
45-64	1972	31.6	27.4	32.9	31.6	29.2	35.3
	1974	30.4	29.0	31.9	29.0	31.3	31.8
	1975	31.8	27.4	36.1	31.9	27.4	30.8
	(Diff.) '72-74	-1.2	1.6	-1.0	-2.6	2.1	-3.5
	(Dif.) '74-75	1.4	-1.6	4.2	2.9	-3.9	-1.0
65 YEARS AND OVER/ 65 ANS ET PLUS	1972	10.4	*	12.8Q	9.7Q	8.6Q	10.9Q
	1974	10.6	7.6Q	14.2Q	9.1Q	9.9Q	11.8Q
	1975	10.8	7.8Q	9.3Q	12.0	11.3Q	12.3Q
	(Diff.) '72-74	0.2		1.4Q	-0.6Q	1.3Q	0.9Q
	(Dif.) '74-75	0.2	0.2Q	-4.9Q	2.9Q	1.4Q	0.5Q
TOTAL 20 YEARS AND OVER/ TOTAL 20 ANS ET PLUS	1972	33.0	30.6	36.9	30.6	31.7	34.4
	1974	32.0	32.0	36.1	29.2	32.0	31.1
	1975	32.0	31.4	34.8	31.0	30.5	30.8
	(Diff.) '72-74	-1.0	1.4	-0.8	-1.4	0.3	-3.3
	(Dif.) '74-75	0.0	-0.6	-1.3	1.8	-1.5	-0.3

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 4

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY LEVEL OF EDUCATION, BY AGE GROUP, CANADA, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LE GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1975

Sex/ Sexe	Age/ Âge	Grade 8 or less/ 8 ^e année ou moins	High School/ Secondaire	Post Secondary/ Universitaire	Total Education**/ Total instruction**
MALES/ HOMMES	15 years and over/ ans et plus	48.5	45.4	30.7	43.3
	15-19	40.1Q	29.3	20.0Q	29.5
	20-24	58.5	56.3	32.2	48.3
	25-44	59.1	53.3	31.2	48.3
	45-64	52.0	48.2	32.1	46.5
	65 and over/ ans et plus	29.6	29.5	23.1Q	29.3
	20 years and over/ ans et plus	48.8	50.7	31.2	45.6
FEMALES/ FEMMES	15 years and over/ ans et plus	27.1	34.5	25.9	31.4
	15-19	40.3Q	27.1	19.0Q	27.4
	20-24	38.9Q	43.9	27.3	38.3
	25-44	36.9	40.0	27.8	37.0
	45-64	30.6	34.5	25.3	31.8
	65 and over/ ans et plus	9.2	12.4	*	10.8
	20 years and over/ ans et plus	26.8	36.5	26.4	32.0
BOTH SEXES/ HOMMES ET FEMMES	Total 15 years and over/ Total 15 ans et plus	37.6	39.7	28.7	37.3
	15-19	40.2	28.2	19.5	28.5
	20-24	49.1	50.1	29.9	43.4
	25-44	47.7	46.1	29.8	42.6
	45-64	41.5	40.7	29.4	39.0
	65 and over/ ans et plus	18.6	19.3	19.8Q	19.0
	Total 20 years and over/ Total 20 ans et plus	37.6	43.0	29.2	38.7

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

** Includes persons with "other" educational training./Comprend les personnes qui ont une "autre" formation.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 5

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY LEVEL OF EDUCATION, BY REGION, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION ET LA RÉGION, 1975

Education/ Instruction	Sex/ Sexe	Canada	Atlantic Region/ Région de l'Atlantique	Quebec/ Québec	Ontario	Prairie Region/ Région des Prairies	British Columbia/ Colombie- Britannique
GRADE 8 OR LESS/ 8 ^e ANNÉE OU MOINS	Male/ Hommes	48.5	49.9	55.7	44.7	41.3	43.8
	Female/ Femmes	27.1	29.7	32.2	24.0	21.3	22.2Q
	Both/ Hommes et Femmes	37.6	40.8	43.2	34.0	31.8	33.2
HIGH SCHOOL/ SECONDAIRE	Male/ Hommes	45.4	44.4	53.4	42.5	42.2	42.8
	Female/ Femmes	34.5	32.0	37.8	33.6	34.3	33.1
	Both/ Hommes et Femmes	39.7	37.7	45.3	37.8	38.1	37.6
POST SECONDARY/ UNIVERSITAIRE	Male/ Hommes	30.7	27.6	35.1	29.7	29.6	27.2
	Female/ Femmes	25.9	25.0	29.2	24.6	24.4	25.3
	Both/ Hommes et Femmes	28.7	26.3	32.6	27.6	27.3	26.4
TOTAL EDUCATION**/ TOTAL INSTRUCTION**	Male/ Hommes	43.3	44.5	50.4	40.6	39.5	39.2
	Female/ Femmes	31.4	30.3	34.6	30.1	29.9	30.3
	Both/ Hommes et Femmes	37.3	37.3	42.4	35.3	34.7	34.7

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

** Includes persons with "other" educational training./Comprend les personnes qui ont une "autre" formation.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 6

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, ACCORDING TO THE NUMBER OF CIGARETTES SMOKED
PER DAY, BY LEVEL OF EDUCATION, CANADA, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES CHAQUE JOUR
ET LE NIVEAU D'INSTRUCTION, CANADA, 1975

Sex/ Sexe	Number of Cigarettes Smoked per Day/ Nombre de cigarettes fumées chaque jour	Grade 8 or less/ 8 ^e année ou moins	High School/ Secondaire	Post Secondary/ Universitaire	Total Education**/ Total instruction**
MALES/ HOMMES	1-10	8.1	7.6	5.3	7.3
	11-25	34.4	33.3	21.7	31.3
	over 25/plus de 25	6.0	4.5	3.7	4.7
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	48.5	45.4	30.7	43.3
FEMALES/ FEMMES	1-10	7.4	9.4	7.8	8.8
	11-25	17.8	22.9	16.6	20.6
	over 25/plus de 25	1.9	2.2	1.5	2.0
	Total regular smokers/ Total, fumeuses habituelles	27.1	34.5	25.9	31.4
BOTH SEXES/ HOMMES ET FEMMES	1-10	7.7	8.6	6.4	8.0
	11-25	26.0	27.8	19.5	25.9
	over 25/plus de 25	3.9	3.3	2.7	3.3
	Total regular smokers/ Total, fumeurs habituels	37.6	39.7	28.7	37.3

** Includes persons with "other" educational training./Comprend les personnes qui ont une "autre" formation.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 7

PERCENTAGE AND RANK ORDER OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS
IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY OCCUPATION, CANADA, 1975

POURCENTAGE ET CLASSEMENT PAR ORDRE DE GRANDEUR DES FUMEURS HABITUELS,
HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS
SELON LA PROFESSION, CANADA, 1975

Occupation/ Profession	Males/Hommes		Females/Femmes	
	%	Rank/ Rang	%	Rank/ Rang
Mn/Pa	38.8	9	39.8	4
Pr/Pl	32.5	10	29.1	8
Cl/Tb	45.8	6	39.5	5
Sa/Ve	45.6	7	37.2	6
Sv/Se	50.2	5	40.8	3
Ou/Te	39.9	8	23.0Q	10
Mp/Mi	53.7	2	41.5	2
Pf/Fp	51.6	4	37.1	7
Cn/B et Tp	53.6	3	*	*
Tr	55.9	1	46.6	1
Nw/C	30.0	11	27.3	9

Mn/Pa	- managerial/professions administratives
Pr/Pl	- professional/professions libérales
Cl/Tb	- clerical/travail de bureau
Sa/Ve	- sales/vente
Sv/Se	- service/services
Ou/Te	- outdoors (farming, etc.)/travail à l'extérieur (agriculture, etc.)
Mp/Mi	- mining, etc./mines, etc.
Pf/Fp	- product fabricating, etc./fabrication de produits, etc.
Cn/B et Tp	- construction/bâtiment et travaux publics
Tr	- transport/transports
Nw/C	- not working/chômeurs

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 8

PERCENTAGE OF REGULAR CIGARETTE SMOKERS IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY RURAL-URBAN DISTRIBUTION, CANADA, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LA RÉPARTITION RURALE ET URBAINE, CANADA, 1975

Sex/ Sexe	Urban/Uraine ≤ 15,000	Urban/Uraine 15,000 - 29,999	Urban/Uraine 30,000 - 99,999	Urban/Uraine ≥ 100,000	Rural/ Rurale
MALES/ HOMMES	45.5	44.3	45.2	42.5	43.0
FEMALES/ FEMMES	32.6	33.9	32.1	31.6	28.9

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre.

TABLE/TABLEAU 9

PERCENTAGE OF OCCASIONAL SMOKERS IN THE MALE AND FEMALE POPULATION
15 YEARS OF AGE AND OVER, BY AGE GROUP, CANADA, 1970, 1974, 1975

POURCENTAGE DE FUMEURS OCCASIONNELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE GROUPE D'ÂGE, CANADA, 1970, 1974, 1975

Sex/ Sexe	Age Group/ Groupe d'âge	1970	1974	1975	Differences/Différences	
					1970-1974	1974-1975
	TOTAL 15 AND OVER/ ANS ET PLUS	3.0	3.4	4.2	0.4	0.8
BOTH SEXES/ HOMMES ET FEMMES	15-19	3.7	5.2	5.4	1.5	0.2
	20-24	4.0	3.8	4.4	-0.2	0.6
	25-44	3.2	3.4	4.1	0.2	0.7
	45-64	2.4	2.7	3.8	0.3	1.1
	65 and over/ et plus	2.0	2.5	3.4	0.5	0.9
	Total 20 and over/ ans et plus	2.9	3.1	4.0	0.2	0.9
	TOTAL 15 AND OVER/ ANS ET PLUS	3.0	3.4	4.2	0.4	0.8
MALES/ HOMMES	15-19	3.7	5.3	5.4	1.6	0.1
	20-24	3.7	3.9	4.3	0.2	0.4
	25-44	2.9	3.2	4.1	0.3	0.9
	45-64	2.4	2.6	3.4	0.2	0.8
	65 and over/ et plus	2.8Q	2.4Q	4.5	-0.4Q	2.1Q
	Total 20 and over/ ans et plus	2.9	3.0	4.0	0.1	1.0
	TOTAL 15 AND OVER/ ANS ET PLUS	3.1	3.5	4.1	0.4	0.6
FEMALES/ FEMMES	15-19	3.8	5.0	5.4	1.2	0.4
	20-24	4.4	3.9	4.6	-0.5	0.7
	25-44	3.4	3.6	4.0	0.2	0.4
	45-64	2.3	2.8	4.1	0.5	1.3
	65 and over/ et plus	*	2.5Q	2.5Q		0.0Q
	Total 20 and over/ ans et plus	2.9	3.2	3.9	0.3	0.7

* Percentage based on population estimates too small to be reliable./Le pourcentage est basé sur des estimations de la population trop restreintes pour être sûres.

Q High sampling variability./Variabilité d'échantillonnage élevée.

Note: Percentages may not add exactly to the totals due to rounding./Étant arrondis, les pourcentages ne correspondent peut-être pas exactement aux totaux.

Source: Percentages based on data collected with the Labour Force Survey by Statistics Canada./Les pourcentages sont basés sur les données recueillies par Statistique Canada dans le Questionnaire de la Main-d'œuvre.

APPENDIX / APPENDICE

SMOKING HABITS OF CANADIANS / L'USAGE DU TABAC AU CANADA

The following questions were included in the December 1975 Labour Force Survey conducted by Statistics Canada/Les questions suivantes étaient incluses dans le Questionnaire de la Main-d'oeuvre administré en décembre 1975 par Statistique Canada:

At the present time/À l'heure actuelle . . .

a. Does this person smoke a pipe?/Cette personne fume-t-elle la pipe?

b. Does this person smoke cigars?/Cette personne fume-t-elle le cigare?

c. Does this person smoke cigarettes?/Cette personne fume-t-elle la cigarette?

NO/NON	YES/OUI	Usually/Habituellement
(Skip to e./Passez à la question e.)	Occasionally/À l'occasion (not every day/pas tous les jours)	(every day/tous les jours)

d. How many cigarettes does this person usually smoke each day?/Combien de cigarettes cette personne fume-t-elle chaque jour?

1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-40	over 40 plus de
-----	------	-------	-------	-------	-------	--------------------

e. Has this person ever smoked cigarettes regularly (i.e., usually every day)?/Cette personne a-t-elle déjà fumé la cigarette de façon régulière (c'est-à-dire habituellement tous les jours)?

NO (end)/NON (fin)	YES/OUI
--------------------	---------

f. What was the main reason, the last time this person stopped or tried to stop smoking cigarettes?/La dernière fois que cette personne a abandonné ou a essayé d'abandonner la cigarette, quelle raison principale a-t-elle invoquée?

Never tried to stop (end)/Je n'ai jamais essayé d'abandonner (fin)	Health/ Raison de santé	<u>Pressures/Pressions</u> Economic Social/ économiques et sociales	Concern for others / Respect des autres	Other/ Autre
--	----------------------------	---	--	-----------------

Don't know/J e ne sais pas

g. What was the principal aid used, the last time this person stopped or tried to stop smoking cigarettes?/ La dernière fois que cette personne a abandonné ou a essayé d'abandonner la cigarette, quelle méthode principale a-t-elle utilisée?

No aid/Aucune méthode	Relatives or friends/ Parents ou amis	Substitutes/ Succédanés	Medical doctor/Médecin
Smokers' clinic/ Clinique des fumeurs	T.V., radio, pamphlets booklets/Télévision, radio, déliants, brochures	Other/Autre	Don't know/J e ne sais pas

V. RÉSUMÉ

- 1) Le pourcentage de fumeurs habituels dans la population canadienne continue de diminuer. En 1975, 38,7 pour cent des Canadiens de 20 ans et plus étaient des fumeurs habituels, en comparaison de 39,6 pour cent en 1974 et de 42,2 pour cent en 1970.
- 2) Les baisses sensibles enregistrées dans le pourcentage de fumeurs habituels masculins, sont en grande partie responsables de la régression dans l'usage régulier du tabac chez les Canadiens. De 1974 à 1975, on a constaté une autre réduction de 1,9 pour cent.
- 3) L'usage régulier de tabac chez la population féminine est demeuré relativement stable au cours de la dernière décennie. En 1975, le pourcentage de fumeuses s'est maintenu à 32 pour cent.
- 4) Le pourcentage de fumeurs habituels chez les adolescents (garçons et filles) a baissé de 1,6 pour cent de 1974 à 1975, passant ainsi à 28,5 pour cent. Ce changement était largement attribuable à une baisse du pourcentage de fumeurs adolescents. Au cours des trois dernières années, le pourcentage d'adolescentes qui fument régulièrement s'est stabilisé à environ 27 ou 28 pour cent de la population féminine de 15 à 19 ans.
- 5) En 1975, le Québec a continué à détenir le plus haut pourcentage de fumeurs masculins de 15 ans et plus (50,4 pour cent). Cette province était suivie par la région de l'Atlantique (44,5 pour cent), l'Ontario (40,6 pour cent), la région des Prairies (39,5 pour cent) et la Colombie-Britannique (39,2 pour cent). La majorité des régions ont enregistré des réductions dans le pourcentage de fumeurs habituels masculins entre 1974 et 1975. C'est le Québec qui a connu la plus forte réduction (4,5 pour cent).
- 6) Au cours de 1975, le plus haut pourcentage de fumeuses habituelles de 15 ans et plus se trouvait encore au Québec (34,6 pour cent), le pourcentage le plus faible ayant été enregistré dans la région des Prairies (29,9 pour cent).
- 7) Un examen du rapport entre le niveau d'instruction et l'usage du tabac a révélé que le plus faible pourcentage de fumeurs habituels masculins se produisait chez les hommes qui avaient une formation universitaire. Le plus haut pourcentage était constaté chez ceux qui avaient une 8^e année ou moins.
- 8) Le plus haut pourcentage de fumeuses habituelles dans la population canadienne de 15 ans et plus se trouvait chez celles qui avaient complètement au moins quelques années de leurs études secondaires (34,5 pour cent). Le pourcentage de fumeuses habituelles ayant une formation universitaire ou une 8^e année ou moins était sensiblement moindre (25,9 pour cent et 27,1 pour cent respectivement).
- 9) Les hommes et les femmes des catégories "transports" et "mines" étaient plus susceptibles d'être des fumeurs habituels que les personnes des autres groupes professionnels.
- 10) Les personnes qui vivaient dans des régions rurales ou dans des grands centres urbains (population de 100 000 habitants) semblaient moins susceptibles de fumer régulièrement que les personnes qui vivaient dans les petites villes.
- 11) Les fumeurs habituels masculins semblaient fumer moins de cigarettes entre 1974 et 1975, partiellement ceux des groupes d'âge de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans. Par contre, le pourcentage des femmes de 20 à 24 ans fumant plus de 25 cigarettes par jour a augmenté.
- 12) De 1974 à 1975, le pourcentage de fumeurs de cigarettes occasionnels de la population canadienne a augmenté légèrement dans tous les groupes d'âge.
- 13) Selon les données de 1975, la majorité des personnes qui ont réussi à abandonner la cigarette n'ont eu recours à aucune méthode pour les aider à cesser de fumer.
- 14) Plus de 50 pour cent des personnes qui ont réussi à abandonner la cigarette l'ont fait pour des raisons de santé.

IV. FUMEURS QUI ONT RÉUSSI À CESSER DE FUMER

Les questions relatives aux personnes qui avaient réussi à abandonner la cigarette ont été incluses dans l'enquête de 1975 sur l'usage du tabac au Canada (Appendice). Les questions ont fourni des renseignements sur: (1) les méthodes principales utilisées pour cesser de fumer, et (2) les principales raisons invoquées pour le faire. Les données ont été analysées en regard de la répartition régionale, du niveau d'instruction, de l'âge et du sexe.

Selon les données de l'enquête de 1975, 11,7 pour cent des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir réussi à abandonner la cigarette. Approximativement 16 pour cent de la population masculine et 7,5 pour cent de la population féminine étaient d'anciens fumeurs habituels.

1) Méthode principale utilisée

Les résultats de l'analyse des données démontrent que, indépendamment de la région, de l'âge, du niveau d'instruction et du sexe, la majorité des personnes ayant réussi à cesser de fumer (75,4 pour cent des hommes et 77,1 pour cent des femmes) n'ont eu recours à aucune méthode pour y arriver. Il se peut par contre que ces chiffres révèlent tout simplement que ces personnes ne veulent pas admettre avoir eu besoin d'aide.

Le pourcentage de personnes qui abandonnaient cette habitude et qui ont pu compter sur l'aide de leurs "parents ou amis" semblait diminuer avec l'âge du sujet. Quoique 13 pour cent des hommes et 8 pour cent des femmes du groupe d'âge de 15 à 19 ans aient reconnu une telle influence, seulement 3 pour cent des hommes et 2 pour cent des femmes du groupe d'âge de 65 ans et plus ont répondu dans l'affirmative à cette partie de la question. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les personnes les plus âgées qui ont répondu dans l'affirmative à la question portant sur l'influence du médecin.

Le pourcentage de personnes recourant à des succédanés ou à des médicaments semblait varier légèrement selon le niveau d'instruction. Les personnes ayant une formation universitaire semblaient compter beaucoup plus sur les substituts que ne le faisaient les personnes ayant une formation primaire (8^e année ou moins, 4 pour cent des hommes; 2 pour cent des femmes; niveau universitaire, 7 pour cent des hommes, 4 pour cent des femmes). En revanche, les personnes ayant une 8^e année ou moins semblaient beaucoup plus influencées par les médicaments que ne l'étaient celles qui avaient un niveau d'instruction plus élevé (8^e année ou moins, 14 pour cent des hommes, 11 pour cent des femmes; niveau universitaire, 5 pour cent des hommes et 4 pour cent des femmes respectivement).

Le recours "aux cliniques de fumeurs" et "à la télévision, à la radio, aux dépliants et aux brochures" ne constituait qu'un très faible pourcentage des réponses. L'accès à ces ressources, en plus d'autres facteurs, a certes influé sur les présents résultats.

ii) Raison invoquée

La majorité des personnes qui ont réussi à abandonner la cigarette (62,2 pour cent des hommes, 56,3 pour cent des femmes) ont indiqué l'avoir fait pour raisons de santé. Il n'est pas étonnant de noter que le pourcentage de personnes de cette catégorie avait tendance à s'élever avec l'âge. Cette tendance semblait plus prononcée chez les hommes. Les autres catégories de réponse ne constituaient qu'un faible pourcentage de l'ensemble des réponses données. Les "pressions économiques" semblaient s'appliquer davantage aux groupes d'âge plus jeunes (15 à 19 ans et 20 à 24 ans) alors que le "respect des autres" était mentionné plus souvent par les femmes que par les hommes.

Il n'y avait que très peu de variations attribuables à la répartition régionale et au niveau d'instruction.

III. FUMEURS DE CIGARETTES OCCASIONNELS

Par définition, un fumeur de cigarettes occasionnel est une personne, qui, habituellement, ne fume pas tous les jours.

Le pourcentage de fumeurs de cigarettes occasionnels de 15 ans et plus a légèrement augmenté, étant passé de 3 pour cent en 1970 à 4,2 pour cent en 1975 (Tableau 9). Ceci peut indiquer que les fumeurs habituels ont réduit leur consommation de tabac ou, d'un autre côté, cela peut tout simplement vouloir dire que plus de Canadiens commencent à fumer.

Comme par le passé, le pourcentage de fumeurs occasionnels était le plus élevé chez les groupes d'âge de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.


Les Tableaux Ia et Ib montrent que la majorité des fumeurs habituels consomment environ 11 à 25 cigarettes par jour. Cette constatation semble s'appliquer tant aux hommes qu'aux femmes de tous les âges.

De 1974 à 1975, le pourcentage d'hommes de 15 ans et plus fumant de 1 à 10, de 11 à 25 et plus de 25 cigarettes par jour, a diminué (Tableau Ia). Les réductions étaient particulièrement manifestes chez les groupes d'âge de 15 à 19 ans, de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans. Par exemple, le pourcentage d'hommes de 20 à 24 ans fumant de 11 à 25 cigarettes par jour a baissé de 2,6 pour cent de 1974 à 1975. De façon semblable, chez le groupe d'âge de 25 à 44 ans, le pourcentage d'hommes fumant de 11 à 25 cigarettes et plus de 25 cigarettes par jour a diminué, de 1,5 pour cent et de 1,2 pour cent respectivement. Une légère augmentation du pourcentage d'hommes âgés de 25 à 44 ans et fumant de 1 à 20 cigarettes par jour peut indiquer que les fumeurs de ce groupe essayent de réduire le nombre de cigarettes fumées par jour.

Selon les données du Tableau Ib, les fumeuses habituelles âgées de 20 à 24 ans et de 45 à 64 ans semblaient avoir une consommation quotidienne plus élevée de 1974 à 1975. Le pourcentage de fumeuses de 20 à 24 ans fumant de 1 à 10 et de 11 à 25 cigarettes par jour, a diminué alors que le contraire se produisait chez celles qui fument plus de 25 cigarettes par jour. Notons ainsi que chez le groupe d'âge de 45 à 64 ans, le pourcentage de femmes fumant de 1 à 10 et de 11 à 25 cigarettes par jour a augmenté.

Le Tableau 6 indique le nombre de cigarettes fumées par jour, selon le niveau d'instruction, par les hommes et les femmes de 15 ans et plus au cours de 1975. Il est curieux de noter que les hommes, et, à un moindre degré, les femmes, qui avaient une formation universitaire fumaient moins de cigarettes par jour que les fumeurs moins instruits. Les fumeurs ayant une 8^e année ou moins avaient la plus grande consommation quotidienne.

FIGURE C
POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS ET PLUS SELON LE GROUPE PROFESSIONNEL, CANADA, 1975




Les différences les plus manifestes dans le classement des hommes et des femmes se trouvaient dans les groupes des "professions administratives" et de la "fabrication de produits". Également notables étaient les petites différences dans les pourcentages d'hommes et de femmes des groupes des "professions administratives", des "professions libérales" et des "chômeurs".

Le comportement des fumeurs des différents groupes professionnels est peut-être lié aux exigences des professions particulières ainsi qu'à l'âge, au sexe et aux facteurs relatifs à l'instruction. En se basant sur les données actuelles, on ne peut que faire des conjectures sur la nature du rapport qui existe entre la profession et l'usage du tabac. Par exemple, il semble bien que les personnes de la catégorie des "professions libérales" seraient plus susceptibles d'avoir une formation au niveau universitaire que celles des groupes des "transports" et des "mines". Comme le révèlent les données de 1975, les personnes ayant une instruction supérieure semblaient moins susceptibles de fumer.

vi) Répartition rurale et urbaine

Comme le démontre le Tableau 8, les personnes vivant dans les régions rurales et les grands centres urbains (population de 100 000 habitants) avaient moins tendance à fumer régulièrement que celles des petites villes.

FIGURE B
POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES,
DANS LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION
LE PLUS ÉLEVÉ, CANADA, 1975



A 8^e année ou moins
B Études secondaires avec ou sans diplôme d'études secondaires
C Études à l'université ou à un collège avec ou sans diplôme d'études universitaires ou collégiales

Le pourcentage de fumeuses, compte tenu du niveau d'instruction, semblait varier de l'Est à l'Ouest. C'est-à-dire qu'au Québec et dans la région de l'Atlantique, le plus haut pourcentage de fumeuses habituelles se trouvait chez les femmes ayant une formation au niveau secondaire, et le pourcentage le plus faible, chez les femmes de formation universitaire. En revanche, en Ontario, dans la région des Prairies et en Colombie-Britannique, le pourcentage le plus élevé de fumeuses était enregistré chez les femmes ayant une formation au niveau secondaire alors que celles qui avaient une 8^e année ou moins affichaient le pourcentage le plus faible.

L'analyse des données régionales selon l'âge a fourni des pourcentages qui étaient basés sur des chiffres trop petits pour être statistiquement valables.

V) Profession et comportement des fumeurs

Comme le démontre la Figure C, l'usage du tabac varie d'un groupe professionnel à l'autre. Un classement des pourcentages de fumeurs habituels de chaque groupe professionnel a révélé que les hommes et les femmes des catégories "transports" et "mines" étaient les plus susceptibles de fumer régulièrement, tandis que ceux des catégories "professions libérales", "chômeurs" et "travail à l'extérieur" étaient le moins susceptibles de fumer (Tableau 7).

Les catégories suivantes ont été utilisées dans l'enquête pour définir le "niveau d'instruction":

- '8^e année ou moins' - Personnes qui ont un niveau d'instruction théorique de 0 à la 8^e année.
- 'Secondaire' - Personnes qui ont commencé et/ou qui ont terminé les cours nécessaires pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires.
- 'Universitaire' - Personnes qui détiennent un diplôme d'études secondaires et qui ont commencé ou terminé les cours requis pour l'obtention d'un diplôme universitaire ou collégial.
- 'Autre' - Personnes qui ont une formation autre que celle des niveaux d'instruction énoncés ci-dessus (Les données portant sur une formation 'autre' n'ont pas été incluses dans le présent rapport).

Dans la population masculine de 15 ans et plus, le pourcentage de fumeurs habituels semblait diminuer avec l'augmentation du niveau d'instruction (Figure b, Tableau 4). En 1975, 48,5 pour cent des hommes ayant une 8^e année ou moins ont signalé qu'ils fumaient régulièrement alors que seulement 45,4 pour cent des hommes au niveau secondaire et 30,7 pour cent au niveau universitaire ont déclaré être des fumeurs habituels.

Le pourcentage le plus important de fumeurs des niveaux d'instruction 'primaire', 'secondaire' et 'universitaire' se trouvait, dans l'ordre, dans les groupes d'âge de 25 à 44 ans (59,1 pour cent), de 20 à 24 ans (56,3 pour cent) et de 20 à 24 ans (32,2 pour cent). Les plus faibles pourcentages ont été observés de façon constante chez les plus jeunes et les plus vieux de chaque niveau d'instruction. Fait particulièrement notable, il y avait, dans tous les groupes d'âge, des pourcentages relativement faibles de fumeurs ayant une formation universitaire. En outre, il semblait y avoir moins de variations entre les groupes d'âge chez les fumeurs de formation universitaire, comparativement aux deux autres catégories.

Quant à la population féminine de 15 ans et plus, les femmes ayant une formation universitaire étaient celles qui étaient le moins susceptibles de fumer régulièrement; seulement 25,9 pour cent d'entre elles ont signalé qu'elles consommaient régulièrement des cigarettes (Figure b, Tableau 4). Toutefois, contrairement à ce qui se produisait dans la population masculine, le plus haut pourcentage de fumeuses se trouvait chez celles qui avaient une formation secondaire (34,5 pour cent). Cette tendance semblait s'appliquer à toutes les femmes, à l'exclusion des adolescentes et des femmes de 65 ans et plus.

Les pourcentages les plus élevés de fumeuses aux niveaux d'instruction 'primaire', 'secondaire' et 'universitaire' se trouvaient chez les groupes d'âge de 15 à 19 ans (40,3 pour cent), de 20 à 24 ans (43,9 pour cent) et de 25 à 44 ans (27,8 pour cent) respectivement.

Parmi les adolescents et les adolescentes, le pourcentage de fumeurs habituels décroissait sensiblement avec l'augmentation du niveau d'instruction. Comme l'indique le Tableau 4, l'usage du tabac chez les adolescents différait sensiblement d'un niveau d'instruction à l'autre; le pourcentage relativement élevé de fumeurs adolescents ayant une 8^e année ou moins (40,2 pour cent) était particulièrement notable. Il n'y avait par contre que très peu de variations dans l'usage du tabac entre les adolescents et les adolescentes à l'intérieur de chacun des niveaux d'instruction.

Le rapport qui existe entre le niveau d'instruction et l'usage de tabac est certes complexe et faudrait étudier systématiquement les effets de l'instruction vis-à-vis des autres variables avant qu'il ne soit possible de mieux interpréter davantage les données actuelles (Tableau 4).

Une comparaison des régions nous révèle que dans toutes les régions, à l'exception des Prairies et peut-être de la Colombie-Britannique, le pourcentage de fumeurs décroît avec l'augmentation du niveau d'instruction (Figure b). Comme l'indique le Tableau 5, les disparités régionales les plus notables en 1975 s'observaient chez les hommes les moins instruits. Le Québec a enregistré le plus haut pourcentage de fumeurs dans chaque niveau d'instruction.

Chez la population féminine, le Québec affichait également le plus élevé de fumeuses habituelles à tous les niveaux d'instruction (Tableau 5). Les variations régionales les plus importantes étaient observées chez les femmes ayant une 8^e année ou moins.

En 1975, les pourcentages les plus élevés de fumeuses ont été observés chez les groupes d'âge de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans, soit 38,3 pour cent et 37 pour cent respectivement. Cependant, on a pu constater des réductions dans le pourcentage de fumeuses parmi ces groupes d'âge plus jeunes depuis 1970. Le Tableau 1b par contre indique une augmentation sensible du pourcentage de fumeuses plus âgées au cours de 1975.

ii) Les adolescents

Le pourcentage de fumeurs habituels chez les adolescents est tombé à 28,5 pour cent, c'est-à-dire qu'il a baissé de 1,6 pour cent entre 1974 et 1975 (Tableau 1c). Cette réduction est conforme aux données recueillies pour les années 1972 et 1973, lesquelles révélaient une stabilisation et peut-être une réduction de l'usage régulier du tabac chez les adolescents.

Des réductions ont été observées chez les garçons depuis 1970. En 1970, 35,7 pour cent des garçons étaient des fumeurs habituels alors qu'en 1974 il n'y en avait que 32,3 pour cent et en 1975, que 29,5 pour cent (Tableau 1a).

Au cours des trois dernières années, le pourcentage d'adolescentes qui fument régulièrement s'est maintenu entre 27 et 28 pour cent de la population féminine âgée de 15 à 19 ans (Figure a).

iii) Répartition régionale

Il continue d'exister des écarts considérables au Canada entre les régions relativement aux fumeurs habituels de cigarettes. Comme dans le passé, le Québec continue à afficher en 1975 le plus haut pourcentage de fumeurs habituels masculins âgés de 15 ans et plus (Rapport technique n° 1, Usage du tabac au Canada de 1965 à 1974). Au Québec, approximativement 50 pour cent des hommes ont déclaré qu'ils fumaient. Cette province était suivie, dans l'ordre, par la région de l'Atlantique (44,5 pour cent), l'Ontario (40,6 pour cent), la région des Prairies (39,5 pour cent), et la Colombie-Britannique (39,2 pour cent) (Tableau 2a).

De 1966 à 1974 (Rapport technique n° 1, Usage du tabac au Canada de 1965 à 1974), toutes les régions ont connu une réduction dans l'usage régulier du tabac chez les hommes. Les données de 1975 indiquent que cette tendance se poursuivait dans toutes les régions à l'exception de la Colombie-Britannique. Au cours de l'année écoulée, cette région a en effet enregistré une hausse de 1,5 pour cent dans le nombre de fumeurs masculins (Tableau 2a). Signalons que les réductions les plus importantes au cours de la période de 1974 à 1975 se sont produites au Québec (4,5 pour cent) et dans la région de l'Atlantique (2,3 pour cent). Ce sont ces régions qui ont enregistré les plus importantes réductions depuis 1970 (Tableau 2a). Au Québec, ce sont les personnes du groupe d'âge de 25 à 44 ans qui, au cours de l'année écoulée, ont enregistré la plus grande proportion de la réduction globale, soit une baisse sensible de 10,4 pour cent (Tableau 3a). Dans la région de l'Atlantique, la plus forte réduction au cours de cette période a été observée chez les garçons (6,2 pour cent), tandis qu'une toute aussi importante réduction de 10,2 pour cent se manifestait chez les fumeurs masculins de 20 à 24 ans en Ontario (Tableau 3a).

Une ventilation régionale des données relatives aux femmes révèle que le Québec détenait le plus haut pourcentage de fumeuses (34,6 pour cent) en 1975. Dans la région de l'Atlantique et en Colombie-Britannique, 30,3 pour cent des femmes de chaque région ont affirmé qu'elles fumaient régulièrement comparativement à 30,1 pour cent en Ontario, et à 29,9 pour cent dans la région des Prairies (Tableau 2b).

De 1974 à 1975, les plus grandes réductions du taux de fumeuses se sont manifestées au Québec, particulièrement chez les femmes âgées de 20 à 24 ans, ainsi que dans la région des Prairies (Tableaux 2b, 3b). Les données pour l'Ontario, par contre, révélaient que les femmes fumaient davantage, surtout chez les groupes de 45 à 64 ans, de 65 ans et plus, et de 25 à 44 ans (Tableau 3b) respectivement. Bien que dans l'ensemble l'usage de la cigarette chez les femmes en Colombie-Britannique ait été relativement stable entre 1974 et 1975, le pourcentage des fumeuses habituelles du groupe d'âge de 20 à 24 ans a augmenté de 9,1 pour cent (Tableau 3b).

Quant aux adolescents, le plus faible pourcentage de fumeurs habituels en 1975 (22,2 pour cent) a été enregistré en Ontario, et le plus haut pourcentage (40,7 pour cent), au Québec. Toutes les régions (à l'exception de la Colombie-Britannique) ont connu une certaine baisse dans le nombre de fumeurs adolescents au cours de cette période, les réductions les plus importantes étant enregistrées dans la région de l'Atlantique et en Ontario (soit 6,2 pour cent et 4,3 pour cent respectivement) (Tableau 3a).

Depuis 1972, l'usage du tabac chez les adolescents semble être demeuré relativement stable dans la plupart des régions sauf au Québec et en Ontario (Tableau 3b). Entre 1974 et 1975, le Québec a connu une importante réduction de 2,6 pour cent alors que l'Ontario a enregistré une augmentation de 1,5 pour cent au cours de la même période.

II. FUMEURS HABITUELS DE CIGARETTES

- 2 -

Par définition, les fumeurs habituels de cigarettes sont ceux qui fument généralement la cigarette tous les jours.


i) Personnes âgées de 20 ans et plus

Selon les données de 1975, l'usage régulier du tabac chez la population canadienne adulte continue de diminuer (Figure a). En 1975, 38,7 pour cent des personnes de 20 ans et plus ont signalé qu'elles fumaient des cigarettes régulièrement. Ce chiffre représente une légère baisse en regard du pourcentage de 1974 et une réduction globale de 3,5 pour cent depuis 1970 (Tableau 1c).

C'est aux baisses substantielles enregistrées dans le pourcentage de fumeurs habituels masculins au cours de la dernière décennie qu'il faut attribuer en grande partie la diminution manifeste de l'usage régulier du tabac parmi les Canadiens. Comme l'indique le Tableau la cette tendance se poursuit. De 1974 à 1975, le pourcentage d'hommes fumant régulièrement a baissé de 1,9 pour cent; les réductions les plus importantes ont été observées chez les groupes d'âge de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans. En revanche, ces groupes d'âge ont continué à détenir le plus haut pourcentage de fumeurs. Approximativement 48 pour cent des hommes dans chacun de ces groupes ont en effet signalé qu'ils fumaient régulièrement.

Dans la population adulte, des deux sexes, on constate qu'un pourcentage uniformément moindre de femmes fument régulièrement, et ce, à tous les âges. Entre 1974 et 1975, le pourcentage de fumeuses s'est maintenu à 32 pour cent (Tableau 1b). Au cours des dernières onze années, le pourcentage de fumeuses habituelles âgées de 20 ans et plus est demeuré relativement stable (Figure a).

FIGURE a
POURCENTAGE DE FUMEURS HABITUELS, HOMMES ET FEMMES, DANS LA POPULATION
DE 15 ANS À 19 ANS ET DE 20 ANS ET PLUS, CANADA, 1965, 1970, 1974, 1975



1. INTRODUCTION

Le présent rapport est basé sur les données recueillies à la suite des enquêtes sur l'usage du tabac au Canada. Ce travail est effectué pour le compte du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social par Statistique Canada, dans le cadre des enquêtes annuelles sur la population active. Des questions ayant trait au comportement des fumeurs sont incluses dans le Questionnaire de la Main-d'œuvre depuis 1965 (voir Appendice). Les enquêteurs s'adressent à soixante-quinze mille Canadiens dans tous les coins du pays, soit environ 30 000 ménages. Sont exclus de l'échantillonnage, les internés et les détenus, les membres des Forces armées, les Indiens des réserves ainsi que les habitants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Le présent rapport porte surtout sur le comportement des fumeurs canadiens au cours des années 1974 et 1975 et à partir de cette base de données il examine les changements dans le comportement des fumeurs habituels et des fumeurs occasionnels de la population canadienne. Les données sur ces groupes de fumeurs sont analysées en fonction du sexe, de l'âge (tranches de cinq ans à partir de l'âge de quinze ans) et de la répartition régionale (la région de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, la région des Prairies, la Colombie-Britannique et la compilation nationale). De plus, le lecteur trouvera une analyse détaillée des fumeurs réguliers en fonction du nombre de cigarettes fumées quotidiennement (de 1 à 10, de 11 à 25, plus de 25). Les données de 1975 renferment en outre des précisions sur le niveau d'instruction, la classification professionnelle et la répartition urbaine.

L'enquête de 1975 sur l'usage du tabac comporte une innovation, à savoir l'étude du groupe de personnes qui ont réussi à abandonner la cigarette. Le présent rapport apporte des renseignements, par sexe, sur les raisons invoquées pour l'abandon de cette habitude, ainsi que les méthodes principales utilisées pour ce faire.

LISTE DES TABLEAUX

Page

Tableau	1a -	Pourcentage de fumeurs habituels dans la population masculine de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et le groupe d'âge, 1970, 1974, 1975	13
	1b -	Pourcentage de fumeuses habituelles dans la population féminine de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et le groupe d'âge, 1970, 1974, 1975	14
	1c -	Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et le groupe d'âge, 1970, 1974, 1975	15
Tableau	2a -	Pourcentage de fumeurs habituels dans la population masculine de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et la région, Canada, 1970, 1974, 1975	16
	2b -	Pourcentage de fumeuses habituelles dans la population féminine de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et la région, Canada, 1970, 1974, 1975	17
Tableau	3a -	Pourcentage de fumeurs habituels dans la population masculine de 15 ans et plus selon la région et le groupe d'âge, 1972, 1974, 1975	18
	3b -	Pourcentage de fumeuses habituelles dans la population féminine de 15 ans et plus selon la région et le groupe d'âge, 1972, 1974, 1975	19
Tableau	4 -	Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le niveau d'instruction et le groupe d'âge, Canada, 1975	20
Tableau	5 -	Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le niveau d'instruction et la région, 1975	21
Tableau	6 -	Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le nombre de cigarettes fumées chaque jour et le niveau d'instruction, Canada, 1975	22
Tableau	7 -	Pourcentage et classement par ordre de gradeur des fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon la profession, Canada, 1975	23
Tableau	8 -	Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon la répartition rurale et urbaine, Canada, 1975	24
Tableau	9 -	Pourcentage de fumeurs occasionnels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le groupe d'âge, Canada, 1970, 1974, 1975	25

LISTE DES FIGURES

Figure a. - Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans à 19 ans et de 20 ans et plus, Canada, 1965, 1970, 1974, 1975	2
Figure b. - Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le niveau d'instruction le plus élevé, Canada, 1975	5
Figure c. - Pourcentage de fumeurs habituels, hommes et femmes, dans la population de 15 ans et plus selon le groupe professionnel, Canada, 1975	6

LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES TABLEAUX	vi
I. INTRODUCTION	1
II. FUMEURS HABITUELS DE CIGARETTES	2
i) Personnes âgées de 20 ans et plus	2
ii) Les adolescents	3
iii) Répartition régionale	3
iv) Niveau d'instruction et comportement des fumeurs	4
v) Profession et comportement des fumeurs	5
vi) Répartition rurale et urbaine	6
vii) Nombre de cigarettes fumées par les fumeurs habituels	7
III. FUMEURS DE CIGARETTES OCCASIONNELS	8
IV. FUMEURS QUI ONT RÉUSSI À CESSER DE FUMER	9
i) Méthode principale utilisée	9
ii) Raison invoquée	9
V. RÉSUMÉ	10
APPENDICE	27
TABLEAUX	11


Bureau de la recherche
Direction de l'usage non médical des drogues
Direction générale de la protection de la santé
Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

USAGE DU TABAC AU CANADA
1975

Rapports techniques
Numéro 7
Décembre 1977



USAGE DU TABAC AU CANADA 1975

 Santé et Bien-être social
Health and Welfare
Canada

